

# IMPACT VAN FMF

Familiaire mediterrane koorts (FMF) komt voor bij mensen van mediterrane afkomst. Een behandeling slaat bij de meeste mensen aan, maar niet alle in behandelingsopties zijn voor iedereen geschikt.<sup>1</sup>

## LICHAMELIJKE IMPACT

Gemiddelde leeftijd bij eerste FMF-aanval:<sup>2</sup>

**2 jaar**

Belangrijkste symptomen van patiënten met FMF:<sup>2</sup>

Artritis (gewrichtsontsteking)  
Vermoeidheid  
Koorts  
Maag-darmklachten  
Ontsteking

## SOCIAL IMPACT

Afwezigheid van school en werk leidt tot slechtere prestaties en verminderde productiviteit<sup>3</sup>

## VERTRAAGDE DIAGNOSE

**78%**

van de patiënten is vóór de diagnose bij maximaal 2 andere artsen geweest<sup>2</sup>

**48%**

van de kinderen kreeg geen of de verkeerde diagnose voordat ze bij een specialist kwamen<sup>2</sup>

Gemiddelde vertraging bij het krijgen van een diagnose:<sup>3</sup>



**2 jaar**

(Gemelde vertragingen tussen de 0 en 22 jaar<sup>2</sup>)

"Ik heb al zowat mijn hele leven last van FMF, en het is fysiek en mentaal doodvermoeiend"

– Patiënt op Twitter<sup>4</sup>