

IMPACT VAN HIDS/MKD

MOEILIK TE DIAGNOSTICEREN

Gemiddelde leeftijd
bij aanvang
symptomen: ²

1 jaar



Gemiddelde leeftijd
bij diagnose
HIDS/MKD: ²

9 jaar



84% van de patiënten kreeg geen of de verkeerde diagnose voordat ze werden doorverwezen naar een specialistisch centrum ²

47%

van de patiënten is voor de diagnose bij meer dan 3 artsen geweest ²

"Als ik een aanval krijg, heb ik geen energie. Ik moet de hele dag in bed liggen tot het over gaat"

– Patiënt, 15 jaar ⁴

SLOPENDE SYMPTOMEN

Belangrijkste symptomen van
patiënten met HIDS/MKD: ²

- Gewrichtsontsteking (artritis)
- Vermoeidheid
- Koorts
- Maag-darmklachten
- Aften
- Pijnlijke lymfeklieren
- Huiduitslag

Gemiddeld aantal koortsaanvallen
per jaar:

**12 - van 5 dagen
per keer ²**

Ongeveer **46%**

van de patiënten gaf aan dat ze door hun
ziekte schoolvertraging hebben opgelopen ³

"Mensen moeten ophouden me lui te noemen en nare opmerkingen te maken, want ze snappen niet wat HIDS is"

– Patiënt ⁴